

No.	適応	レジメン名	標準薬剤使用量	標準投与クール
1	胃がん	XP療法+ハーセプチン	シスプラチン80mg/m ² (day1)、トラスツズマブ初回8mg/kg、以降6mg/kg (day1)、カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 PO(day1-14)	3週毎
2		weeklyPTX(E法)	パクリタキセル80mg/m ² (day1、8、15)	4週毎
3		G-SOX	オキサリプラチン100mg/m ² (day1)、テガフル・キメラシル・オテラシル1回40mg/m ² 1日2回 PO(day1-14)	3週毎
4		G-SOX+HER	オキサリプラチン100mg/m ² (day1)、トラスツズマブ初回8mg/kg、以降6mg/kg (day1)、テガフル・キメラシル・オテラシル1回40mg/m ² 1日2回 PO(day1-14)	3週毎
5		サイラムザ	ラムシルマブ8mg/kg(day1)	2週毎
6		PTX+サイラムザ	パクリタキセル80mg/m ² (day1、8、15)、ラムシルマブ8mg/kg(day1、15)	4週毎
7		XELOX	オキサリプラチン100mg/m ² (day1)、カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 PO (day1-14)	3週毎(術後化学療法は8コース)
8		CPT-11単独療法	イリノテカン150mg/m ² (day1)	2週毎
9		オプジーボ療法	ニボルマブ240mg/body(day1)	2週毎
10	食道がん	FP療法	シスプラチン80mg/m ² (day1)、5-FU800mg/m ² /day(day1-5)	3週毎(術後化学療法は2コース)
11		5-FU+NDP(FN療法)	ネダプラチン75mg/m ² (day1)、5-FU750mg/m ² /day(day1-5)	4週毎
12		DCF療法	ドセタキセル65mg/m ² (day1)、シスプラチン75mg/m ² (day1)、5-FU750mg/m ² /day(day1-5)	4週毎
13		DTX+NDP(DN療法)	ドセタキセル30mg/m ² (day1)、ネダプラチン40mg/m ² (day1)	2週毎
14		FP+Rad(JCOG)	シスプラチン70mg/m ² (day1)、5-FU700mg/m ² /day(day1-4)	4週毎 2コース
15		FP+Rad(RTOG)	シスプラチン75mg/m ² (day1)、5-FU1000mg/m ² /day(day1-4)	4週毎 2コース
16		PTX単独療法(B法)	パクリタキセル100mg/m ² (day1、8、15、22、29、36)	7週毎
17		DTX単独療法	ドセタキセル70mg/m ² (day1)	3週毎
18		CPT-11+Bmab	イリノテカン150mg/m ² (day1)、ベバシズマブ7.5mg/kg(day1)	2週毎
19		CPT-11+S1(IRIS療法)	イリノテカン125mg/m ² (day1、15)、テガフル・キメラシル・オテラシル1回40mg/m ² 1日2回 PO(day1-14)	4週毎
20		CPT-11+S1(IRIS療法)+Bmab	イリノテカン125mg/m ² (day1、15)、ベバシズマブ5mg/kg(day1、15)、テガフル・キメラシル・オテラシル1回40mg/m ² 1日2回 PO(day1-14)	4週毎
21		CPT-11+S1(IRIS療法)+Pmab	イリノテカン125mg/m ² (day1、15)、パニツムマブ6mg/kg(day1、15)、テガフル・キメラシル・オテラシル1回40mg/m ² 1日2回 PO(day1-14)	4週毎
22		FOLFIRI	イリノテカン150mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)	2週毎
23		FOLFIRI+Bmab	イリノテカン150mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)、ベバシズマブ5mg/kg	2週毎
24		FOLFIRI+Pmab	イリノテカン150mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)、パニツムマブ6mg/kg	2週毎
25		FOLFIRI+Rmab	イリノテカン150mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)、ラムシルマブ8mg/kg	2週毎

26	大腸がん	FOLFIRI+ザルトラップ	イリノテカン150mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)、アフリベルセプト4mg/kg	2週毎
27		CAPOX	オキサリプラチン130mg/m ² (day1)、カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 PO (day1-14)	3週毎
28		CAPOX+Bmab	オキサリプラチン130mg/m ² (day1)、ベバシズマブ7.5mg/kg(day1)、カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 PO(day1-14)	3週毎
29		CAPOX+Pmab	オキサリプラチン130mg/m ² (day1)、パニツムマブ6mg/kg(day1)、カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 PO(day1-14)	3週毎
		CAPIRI療法	イリノテカン200mg/m ² (day1)、カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 PO(day1-	
30		mFOLFOX6	オキサリプラチン85mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)	2週毎
31		mFOLFOX6+Bmab	オキサリプラチン85mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)、ベバシズマブ5mg/kg	2週毎
32		mFOLFOX6+Pmab	オキサリプラチン85mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)、ベバシズマブ5mg/kg (day1)、パニツムマブ6mg/kg(day1)	2週毎
33		SOX(S1+L-OHP)	オキサリプラチン130mg/m ² (day1)、テガフル・キメラシル・オテラシル1回40mg/m ² 1日2回 PO (day1-14)	3週毎
34		SOX(S1+L-OHP)+Bmab	オキサリプラチン130mg/m ² (day1)、ベバシズマブ7.5mg/kg(day1)、テガフル・キメラシル・オテラシル1回40mg/m ² 1日2回 PO (day1-14)	3週毎
35	胆管がん	GEM+CDDP(GC療法)	シスプラチン25mg/m ² (day1、8)、ゲムシタビン1000mg/m ² (day1、8)	3週毎
36	膵がん	GEM単独療法	ゲムシタビン1000mg/m ² (day1、8、15)	4週毎
37		GEM+nab-PTX	ゲムシタビン1000mg/m ² (day1、8、15)、ナブパクリタキセル125mg/m ² (day1、8、	4週毎
38		FOLFIRINOX	オキサリプラチン85mg/m ² (day1)、イリノテカン180mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU急速静注400mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ²	2週毎
		modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン85mg/m ² (day1)、イリノテカン150mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)	2週毎
39		nal-IRI+5-FU/LV	リポソーマルイリノテカン70mg/m ² (day1)、レボホリナート200mg/m ² (day1)、5-FU持続静注2400mg/m ² (day1)	2週毎