

ID:

診療科

主治医:

目付

O/□

ゲムシタビン単独療法

◎**ゲムシタビン**という点滴の治療薬を使用します。

◎治療は4週間を一区切り(1サイクル)として行います。

＜スケジュール＞

コース目	目目	ゲムシタビン	mg
------	----	--------	----

29日目からは、新しいサイクルです。

[illegible]

＜副作用と現れやすい時期＞

副作用と経過		経過観察期間																															
日数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	・	・	・
アレルギー症状		▶ 治療開始から息苦しさ・胸の苦しさ・発疹など ▶																															

起こりやすい: 白血球減少、食欲不振、吐き気

時に起こる：静脈炎、手足のしびれ、血小板減少、貧血、疲労感、肝機能異常、腎機能異常、味覚の変化

まれに起こる: 口内炎、便秘、間質性肺炎、視力の異常など

副作用の現れ方には個人差があり、すべての副作用が必ず起こるわけではありません。副作用に対しては、症状の現れ方にあわせて症状を和らげる治療を行うことがあります。また、症状が強く、治療を継続することが困難な場合は、治療薬の減量や一時中断、あるいは薬の変更をすることもあります。

◎本日の検査結果

	值
白血球数	$\times 10^9/\mu\text{L}$
好中球数	$\times 10^9/\mu\text{L}$
血小板数	$\times 10^9/\mu\text{L}$
血色素量	g/dL

◎副作用の状況

	グレード	グレード
白血球減少:		
好中球数減少:		
血小板数減少:		
悪心:		
嘔吐:		

副作用のグレード(重症度)について

0: 症状がない

1: 軽い症状はあるが治療は必要ない

2: 中程度の症状があり、治療が必要

3: 緊急性はないが、重い症状があり入院などの治療が必要

4: 緊急の処置が必要

有害事象共通用語規準v5.0日本語訳JCOG版(CTCAEv5.0-JCOG)