

日付 ○/□

ゲムシタビン+アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル)療法

◎**ゲムシタビンとアブラキサン**という点滴の治療薬を使用します。

◎治療は4週間を一区切り(1サイクル)として行います。

＜スケジュール＞

「29日目からは、新しいサイクルです。」

[illegible]

＜副作用と現れやすい時期＞

[illegible]

起こりやすい：白血球減少、脱毛

時に起こる：食欲不振、下痢、静脈炎、手足のしびれ、爪の変形、
下痢、疲労感、肝機能異常、腎機能異常、味覚の変化

まれに起こる: むくみ、間質性肺炎など

副作用に対しては、症状の現れ方にあわせて症状を和らげる治療を行うことがあります。

また、症状が強く、治療を継続することが困難な場合は、治療薬の減量や一時中断、あるいは薬の変更をすることもあります。

◎本日の検査結果

◎副作用の状況

値	グレード	グレード
白血球数 ×10 ³ 個/μl	白血球減少:	
好中球数 ×10 ² 個/μl	好中球数減少:	
血小板数 ×10 ³ 個/μl	血小板数減少:	
血色素量 g/dl	悪心:	
	嘔吐:	

副作用のグレード(重症度)について

0: 症状がない

1:軽い症状はあるが治療は必要ない

2: 中程度の症状があり、治療が必要

3: 緊急性はないが、重い症状があり入院などの治療が必要

4: 緊急の処置が必要

有害事象共通用語規準v5.0日本語訳JCOG版(CTCAEv5.0-JCOG)

情報共有シート【GEM+nab-PTX】 2024/3/24改訂

※この説明書は、保陰薬局などの医療機関でもご提示ください

〒397-8555 長野県木曽郡木曽町福島6613-4 電話:0264-22-2703(代表)

長野県立木曽病院薬剤部 担当薬剤師: